

비타민 B₁₂ 주사제

티아민플러스⁺주

푸르셀티아민염산염

전문 의약품

분류번호 : 312

【원료약품 및 그 분량】 이 약 1mL 중
 • 유효성분: 푸르셀티아민염산염(KP) 2,729mg
 (푸르셀티아민으로서 2.5mg)

• 첨가제(안정제): 포도당(KP) 200mg
 • 용제: 주사용수(KP) 적량
 • 기타첨가제: 수산화나트륨, 염산

【성상】

무색의 맑은 액이 옅은 갈색의 유리앰플 속에 들어있는 주사제

【효능·효과】

1. 비타민 B₁₂ 결핍증의 예방 및 치료
2. 비타민 B₁₂의 수요가 증대하여 음식으로부터 섭취가 불충분한 때의 보급(소모성 질환, 갑상선기능항진증, 임부, 수유부, 격렬한 육체 노동 시 등)
3. 베르니케뇌병증(Wernicke encephalopathy)
4. 각기심장 장애
5. 다음 질환에 의한 비타민 B₁₂의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우
 - 1) 신경통 2) 근육통, 관절통 3) 말초 신경염, 말초 신경 마비
- 4) 심근 대사 장애 5) 수술 후 장과 마비

비타민 B₁₂의 결핍 또는 대사 장애가 관여한다고 추정되는 경우에 대하여 효과가 없는 데 1개월가량 목적 없이 사용해서는 안된다.

【용법·용량】

푸르셀티아민으로서 보통 성인 1일 5~100mg을 피하, 근육내 또는 정맥내 주사한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

앰플주사제는 용기 절단시 유리파편이 혼입되어, 이상반응이 나타날 수 있으므로 사용 시 유리파편의 혼입이 최소화 될 수 있도록 신중하게 절단 사용되되, 특히 소아, 고령자 사용 시에는 특히 주의한다.

- 유효기간 또는 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 의약품(수입의약품 포함)등은 약국 등의 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 당사 영업사원을 통하여 교환하여 드립니다.
- 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.skchemicals.com/ls)나 제품상담 전용 전화를 통하여 확인할 수 있습니다.
- 본 의약품을 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.
- 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
- 자세한 사항은 '의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr)'을 참조하십시오.
- 제품 사용 후 부작용(이상반응)이 발생한 경우 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 문의하여 부작용 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

2016. 5. 30, 작성
 ※ 2017. 12. 8. 개정
 (Ver. 003)

SK 케미칼
 Life Science Biz.
 에스케이이비엔(주)

충청북도 청주시 흥덕구 신안로 149

자세한 문은의 제품상담 전용전화를 이용하시기 바랍니다.

제품상담 전용전화(무로)080-969-9966

제조사



주 비씨월드제약

경기도 여주시 가남읍 여주남로 872-23

판매자



SK 바이오사이언스

에스케이바이오사이언스(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 310